

# 『トビイロウンカ警報発表！』

岡山県病害虫防除所よりトビイロウンカの発生予察警報が発表されました。防除所による8月17～18日の巡回調査において、県下全域で平年を上回る発生率が確認され、さらに、一部のほ場では増殖率の高い短翅型雌成虫たんしがたも確認されています。管内においても、JA営農指導員による現地調査の際にトビイロウンカと疑わしき個体が確認されております。

## まずは基幹防除を必ず行いましょう。

### 対策について

- 早生品種は収穫期が近い場合の薬剤散布では、収穫前日数をよく確認して応急防除剤にて防除を行い、収穫間際なら収穫しましょう。
- 中生品種は今年 出穂が早い傾向にありますので、散布時期に注意しながら基幹防除を行い、場合によっては応急防除も行いましょう。
- 晩生品種は出穂まで日数があるので、基幹防除を必ず行いましょう。



トビイロウンカによる坪枯れ

### トビイロウンカの防除薬剤

R2.8.20現在

	薬剤名	使用時期	使用回数
基幹防除剤	ゴウケツモンスター粒剤	出穂5日前まで 但し、収穫45日前まで	1回
	イッカツエース粉剤DL	穂揃期まで	2回以内
	ハスラーRX粉剤DL	収穫14日前まで	2回以内
	ブラシンジョーカー粉剤DL	収穫7日前まで	2回以内
	ブラシンジョーカーフロアブル	収穫14日前まで	2回以内
	ブラシントレバリダ水和剤	収穫14日前まで	2回以内
	トライトレボン粉剤DL	収穫14日前まで	2回以内
応急防除剤	トレボン粉剤DL	収穫7日前まで	3回以内
	なげこみトレボン	収穫21日前まで	3回以内
	スタークル粉剤DL	収穫7日前まで	3回以内
	アルバリン粉剤DL	収穫7日前まで	3回以内
	スタークル豆つぶ	収穫7日前まで	3回以内
	キラップジョーカー粉剤DL	収穫14日前まで	2回以内
	キラップジョーカーフロアブル	収穫14日前まで	2回以内
	アプロードフロアブル※	収穫7日前まで	4回以内
アプロード水和剤※	収穫7日前まで	4回以内	

※ アプロード剤はウンカ類幼虫の脱皮阻害剤のため、成虫への効果はありませんが、次世代による被害軽減を目的にした剤です。

粉剤・液剤の散布に当たっては、薬剤が株元まで十分到達するよう留意しましょう。また、散布時に湛水状態にすることにより、ウンカが株元から上がり、薬剤が付着しやすくなります。

散布後も他の病害虫の発生も含めて、経過観察をしっかりと行いましょう。